

กษ.เตือนหนอนกออ้อยระบาด แนะวิธีกำจัดใช้ศัตรูธรรมชาติ

8 กสก. : นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า จากข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูอ้อยพบการเข้าทำลายของหนอนกออ้อยในหลายพื้นที่ภาคกลาง อาทิ เพชรบูรณ์ กำแพงเพชร และลพบุรี ขอให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยทั่วประเทศหมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะอ้อยในระยะแตกกอ ให้ระวังการระบาดของหนอนกอลายจุดเล็ก หนอนกอสีข้าว และสีชมพู หากพบการเข้าทำลายให้รีบขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัด เพื่อดำเนินการป้องกันกำจัดก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ซึ่งลักษณะการทำลายของหนอนกออ้อย ให้สังเกตโชหนอนทั้งชนิดที่คล้ายเกล็ดปลาและไข่มัดกลมสีข้าว หรือชมพูบริเวณบนใบ ใต้ใบ และในกาบใบที่แนบอยู่บริเวณยอดใบ หากพื้กตัวจะกัดกินผิวใบหรือหนอนอ้อยในระยะสั้นๆ จากนั้นจะเจาะเข้าลำต้นที่อยู่บริเวณผิวดินเพื่ออาศัยอยู่ในกออ้อย และมีนิสัยชอบเคลื่อนย้ายไปทำลายหนอนใหม่ โดย 1 ตัว

สามารถทำลายอ้อยได้ 3-4 หน่อ ซึ่งหนอนกออ้อยทั้ง 3 ชนิดจะพบเข้าทำลายอ้อยมากตั้งแต่ระยะแทงหน่อ จนถึงระยะแตกกอ

นายประสงค์ กล่าวว่า สำหรับวิธีการป้องกันกำจัดหนอนกออ้อย คือ ลดการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในระยะเริ่มปลูก เพราะหนอนจะชอบเข้าทำลายหน่ออ้อยอวบ หมั่นสำรวจแปลงอ้อยอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น ปล่อยแตนเบียนหนอนโคที่เขียวหรือปล่อยแตนเบียนไซตรีโคแกรมมา เมื่ออ้อยอายุ 2 เดือน หรือปล่อยแมลงหางหนีบ กรณีที่ต้องไถตออ้อยทิ้งให้ทำลายตออ้อยให้หมด เพื่อกำจัดหนอนหรือดักแด้ที่อยู่ในตออ้อย และหากจำเป็นต้องใช้สารเคมีให้พ่นด้วยปิโตรเลียมออยล์ 83.9% อีซี 100 มิลลิลิตร ต่อ น้ำ 20 ลิตร โดยพ่นก่อนการปล่อยแตนประมาณ 10-15 วัน หรือพ่นด้วยสารเคมีกำจัดแมลงอื่น ซึ่งสามารถสอบถามขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ/จังหวัดได้ทั่วประเทศ